



## Patarimai dėl biologinio saugumo

- ✓ Kiaulių augintojas įtaręs, kad jo laikomos kiaulės serga afrikiniu kiaulių maru, privalo nedelsdamas pranešti Norvegijos veterinarijos tarnybai. Tipiniai afrikinio kiaulių maro ligos simptomai: padidėjusi temperatūra, sumažėjęs apetitas, pakitimai odoje ir staigus gaišimas.
- ✓ Draudžiama šerti gyvūnus maisto atliekomis.
- ✓ Ribokite pašalinių asmenų patekimą į gyvūnų laikymo vietas. Taikykite apsaugos priemones, tokias kaip persiavimas kita avalyne ir persivilkimas kitais drabužiais. Tai ypač aktualu su žemės ūkiu susijusių lankytojų iš užsienio atveju.
- ✓ Jeigu lankydami kitoje šalyje turėjote kontaktų su kiaulėmis ar šernais, 48 h. nesilankykite Norvegijoje esančiuose ūkiuose.
- ✓ Jeigu lankydami kitoje šalyje, kurioje yra nustatytos ypač pavojingos gyvūnų užkrečiamosios ligos, turėjote kontaktų su kiaulėmis ar šernais, 72 h. nesilankykite Norvegijoje esančiuose ūkiuose.
- ✓ Grįžę iš kitos šalies, prieš eidami į Norvegijoje esantį ūkį nusiprauskite po dušu ir išsiplaukite galvą.
- ✓ Išskalbkite rūbus, kurie buvo dėvimi turint kontaktų su gyvūnais kitose šalyse (ne žemesnėje nei 60°C temperatūroje), išvalykite ir dezinfekuokite avalynę.
- ✓ Prisiminkite, kad yra draudžiama įsivežti gyvūninės kilmės produktus iš ne Europos Sąjungos šalių į Norvegiją ir Europos Sąjungos šalis.